

Farcosedan®

Lidocainhydrochlorid 2%, Chlorhexidindigluconat 0,05%

steril

Steriles Gleitmittel mit unterstützenden lokalanästhesierenden und desinfizierenden Eigenschaften.

Enthält: Lidocainhydrochlorid 2%, Chlorhexidindigluconat 0,05%, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propylenglycol, Hydroxyethylcellulose, Natriumhydroxid.

Anwendungsgebiete: Gleitmittel mit unterstützenden lokalanästhesierenden und desinfizierenden Eigenschaften zum erleichterten Einführen von Kathetern und Instrumenten.

Eigenschaften: Farcosedan® haftet gut auf der Schleimhaut und lässt die Optiken der Instrumente sichtbar. Farcosedan®

ist steril.

Nebenwirkungen: In sehr seltenen Fällen können allergische Reaktionen (Hautreizungen, in den schwersten Fällen ein anaphylaktischer Schock) auf einen der Inhaltsstoffe auftreten.

Gegenanzeigen: Farcosedan® darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Lidocainhydrochlorid, Chlorhexidin, Alkyl-4-Hydroxybenzoaten (Parabenen) oder einen der sonstigen Bestandteile.

Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit: Die Anwendung von Lidocain in der Schwangerschaft sollte nur erfolgen, wenn

eine unbedingte Notwendigkeit besteht. Lidocain passiert die Plazenta rasch. Bei Neugeborenen mit hohen Plasmakonzentrationen kann Lidocain eine Dämpfung des ZNS und damit eine Senkung des Apgar-Scores bewirken. Lidocain geht in geringer Menge in die Muttermilch über.

Hinweis: Bei stark blutenden Wunden können auf Grund einer möglichen Lidocain-Resorption in sehr seltenen Fällen Nebenwirkungen auftreten. Über die erforderlichen Therapiemaßnahmen entscheidet der Arzt.

Dosierungsanleitung: Farcosedan® eignet sich zum Einbringen ins Rektum vor operativen Eingriffen. Die genaue Anwendung von Farcosedan® im Rektum ist der Hand-

habung zu entnehmen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit: Farcosedan® nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden! Gefreste werfen und leere Spritze nicht für andere Zwecke verwenden, da es sonst zur Übertragung von Keimen kommen kann.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Eine Einzelspritze enthält 20 ml Gel.


Stand der Information: Oktober 2012

Latexfrei.

Handhabung. Bitte aufmerksam lesen!



Farcosedan®-Spritze zur Hand nehmen und bei aufgesteckter Verschlusskappe den Druckpunkt der Spritze lösen.



Rektal-Applikator auf die Farcosedan®-Spritze stecken.



Anus desinfizieren. Einige Tropfen Farcosedan® am Anus platzieren, den Applikator komplett einführen und bei gleichzeitiger Herausziehung Restmenge Farcosedan® vollständig in das Rektum instillieren.